

Celtis australis – Lledoner

Gènere: Celtis

Espècie: australis

Família: ulmàcies

Origen geogràfic: regió Mediterrània

Nom comú: lledoner

Característiques: És un arbre caducifoli, de capçada arrodonida, amb una alçada d'entre 10 i 15 m, i una amplada de capçada d'entre 6 i 8 m. L'escorça és llisa, de color gris. Les fulles són simples, ovades, aspres, fan entre 5 i 12 cm, de color verd fosc per l'anvers i verd mitjà pel revers. La floració es produeix a la primavera, amb flors petites i solitàries, de 5 mm i d'un color groc verdós. Els fruits, anomenats lledons, són drupes d'entre 8 i 12 mm, de color porpra fosc a la maduresa, i apareixen al principi de la tardor.



Nom científic:	Celtis australis	PH tolerat:	6 - 7,8
Nom comú:	Lledoner	Resistència al vent:	Alta
Resistència a la salinitat:	Mitjana	Resistència a la contaminació:	Alta
Tipus:	Froncosa	Època de poda:	Hivern
Fullatge:	Caducifoli	Tipus de fulla:	Simple
Port:	Esfèric	Mida de la fulla:	Petita
Alçada:	15	Forma de la fulla:	Ovada
Amplada:	> 6	Color de la fulla:	Verd fosc

Longevitat:	Molt longeu - mes de 200 anys	Color de la flor:	Groc verdós
Tolerància a la sequera:	Alta	Època floració:	Primavera
Necessitats hídriques:	Mitjana	Color fructificació:	Porpra fosc
Tolerància baixes tº:	Alta	Època fructificació:	Tardor
Textura ideal del sòl:	Sorrenc, franc, argilós	Color de l'escorça:	Gris
Tipus de sòl:	Tot tipus de sòl	Forma del tronc:	Recte amb enforcadura
Ombra:	No	Variabilitat estacional:	Sí
Sol:	Sí	Floració aparent:	No
SemiOmbra:	Sí	Afectació paviment:	Moderat

Koelreuteria paniculata - Sapinde de la Xina

Gènere: Koelreuteria

Espècie: paniculata

Família: sapindàcies

Origen geogràfic: Xina

Nom comú: sapinde de la Xina

Característiques: És un arbre caducifoli, de capçada arrodonida, amb una alçària d'entre 7 i 12 m, i una amplada de capçada d'entre 4 i 6 m. L'escorça és fissurada i de color gris marronós.

Les fulles són compostes, pinnades i fan entre 35 i 50 cm, amb folíols de 4 a 9 cm; de color verd fosc per l'anvers i verd mitjà pel revers, quan broten són de color vermell o bronze rosat i es tornen d'un efectiu color groc a la tardor. La floració es produeix de manera força aparent, entre finals de primavera i principis d'estiu, amb flors d'1 cm de diàmetre i de color groc, agrupades en inflorescències que formen grans panícules penjants d'entre 25 i 40 cm. Els fruits són càpsules inflades, d'entre 2 i 4 cm, de color verdós primer i d'un vermellós molt ornamental quan són madurs, que maduren a la tardor i pengen de l'arbre durant molt de temps.



Acer campestre - Auró blanc

Gènere: Acer

Espècie: campestre

Família: aceràcies

Origen geogràfic: Europa i nord d'Àfrica

Nom comú: auró blanc

Característiques: És un arbre caducifoli de capçada arrodonida, lleugerament irregular, amb una alçària d'entre 8 i 12 m, i una amplada de capçada d'entre 4 i 6 m. L'escorça està fissurada verticalment i és de color marró groguenc. Les fulles són simples, palmades, amb cinc lòbuls i fan de 5 a 10 cm; són de color verd fosc mat per l'anvers i verd pàl·lid pel revers, i a la tardor es tornen d'un bonic to daurat. La floració es produeix entre l'abril i el maig. Les flors són diminutes, d'uns 2 mm, no vistoses i de color groc verdós, i s'agrupen en corimbos erectes de 4 a 6 cm. Els fruits són disàmars totalment obertes, de 3 a 4 cm i de color verd marronós, que maduren a la tardor.



Nom científic:	Acer campestre	PH tolerat:	5,5 - 8
Nom comú:	Auró blanc	Resistència al vent:	Alta

Resistència a la salinitat:	Mitjana	Resistència a la contaminació:	Alta
Tipus:	Frondosa	Època de poda:	Hivern
Fullatge:	Caducifoli	Tipus de fulla:	Simple
Port:	Esfèric	Mida de la fulla:	Petita
Alçada:	6-10m	Forma de la fulla:	Palmada
Amplada:	4m	Color de la fulla:	Verd fosc mat
Longevitat:	Mitjana - 26 a 100 anys	Color de la flor:	Groc verdós
Tolerància a la sequera:	Mitjana	Època floració:	Primavera
Necessitats hídriques:	Mitjana	Color fructificació:	Verd marronós
Tolerància baixes tº:	Alta	Època fructificació:	Tardor
Textura ideal del sòl:	Sorrenc, franc, argilós	Color de l'escorça:	Marró groguenc
Tipus de sòl:	Tot tipus de sòl	Forma del tronc:	Recte amb enforcadura
Ombra:	No	Variabilitat estacional:	Sí
Sol:	Sí	Floració aparent:	No
SemiOmbra:	Sí	Afectació paviment:	No

Fraxinus Angustifolia 'Raywood'

Gènere: Fraxinus

Espècie: Angustifolia

Var. Raywood

Família: oleàcies

Origen: Conreat.

Sòl: Neutre, Profund.

Exposició: sol i semi ombra.

Humitat: Mitjana-Alta.

Arbre caduc de port allargat d'uns 10m d'alçada. Les fulles son compostes, folíols lanceolats, serrats i oposats.

Es distingeix pel seu fullatge verd fosc que es torna porpra vermellós a la tardor. Destaca pel seu ràpid creixement i el color tardorenc de les seves fulles.

